

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL

(Tél.: 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER C. C. P. MONTPELLIER 5.238.57

Nº 31 15 F

2° Supplément. 10-4-63

Aude, Hérault, Gard, Pyr-Or.

TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Les Pluies générales et abondantes qui se sont produites depuis le 4 avril sur l'ensemble de la région (avec moins d'intensité dans la plaine du Roussillon, région I) ont empêché l'exécution du traitement préconisé le ler Avril par notre bulletin nº 31.

Cette situation peut être extrêmement préoccupante à l'égard des vergers de poiriers; en particulier dans la région 4 (Aude atlantique) où la floraison s'est achevée, les jeunes fruits très sensibles aux contaminations ne sont pas protégés. Il faut dès réception du présent bullatin exécuter un traitement qui devra être réalisé avant le 18 avril. Si le traitement préconisé le 1° avril a pu être exécuté avant les pluies, on pourra retarder la nouvelle pulvérisation jusqu'au 20 avril.

Dans les plantations de pommiers , le retard de la floraison rend la situation moins inquiétante. Espendant une protection doit être réalisée partout.

Le retard de la végétation du pommier étant important dans les régions montagneuses, l'usage des produits contenant du cuivre reste possible pour les vergers d'altitude :

- régions 2 et 6 (Vallespir, Conflent)

- régions 7 et 11 (Montagne Noire, St-Ponais, Hte Vallée de l'Orb)

- régions 15 ct 17 (Cévennes).

En Cerdagne (région 3), Pays de Sault (région 5) et Montagne de Lacaune (région 10) les conditions climatiques font déconseiller tout traitement avant une amélioration de la situation actuelle.

MONILIA et OIDIUM DE L'ABRICOTIER

Réaliser un nouveau traitement contre ces deux maladies, soit par la pulvérisation d'un soufre micronisé, soit par la pulvérisation d'une bouillie réunissant un anticryptogamique au diphénylcrotonate.

RHYNCHITES et CHENILLES DEFOLIATRICES DE L'ABRICOTIER

De petits coléoptères (rhynchites) et diverses chenilles, dont les arpenteuses, peuvent s'attaquer aux jeunes feuilles et aux fruits encore très tendres. Associer un insecticide à la bouillie anticryptogamique.

MONILIA DU CERISIER

Bien que cette maladie soit peu répandue dans nos quatre départements littoraux elle est susceptible cette année de détruire les fleurs des variétés à floraison tardive eu égard à la climatologie déplorable que nous subissons. Traiter les cerisiers en leur appliquant les produits conseillés contre le Monilia de l'abricotier. DLP 17-4-63 208719

L'Inspecteur, P. BERVILLE

Les Contrôleurs, L.L. TROUILLON M. BEZUT

Imprimerie de la Station du Languedoc-Roussillon. Le Directaur Gérant : L. BOUYX

1963-